

De 3 første dagene i oppalet.



Flokken skal ha tilgang til minimum 2 drikkenippelrekker pr. bingje.

Det skal i tillegg være god tilgang til drikkekopper med vann de 3 første dagene av innsette. Det skal være minimum to drikkerrekker, og det skal maksimum være 8 dyr pr drikkenippel.

Moderat gulvtemperatur, 28-30°C. Tilstreb luftfuktighet på 60-70 % RH ankomstdagen. Dyra skal være ute av kassene og fordelt i løpet av 20 min etter ankomst! De blir svært lett overopphetet i kassene. Senk gjerne lysstyrken i huset til minimalt "arbeidslys" når du setter inn dyra. Styr kyllingene vekk fra deg med lys eller bruk papir som skille mellom deg og dyra. Lysstyrke minst 40 lux, jevnt fordelt i rommet de første dagene etter innsetting.


Små daggamle kyllinger fra unge foreldredyr trenger mer varme enn større daggamle kyllinger. Dersom du har et øretermometer, kan du måle temperaturen ved å legge det mot kloakken. 39,4-40,4°C er bra.

Gå så ofte som mulig i huset i starten for å stimulere flokken til å komme i gang. Tilvenn dyra uvante lyder. Sørg for god ventilasjon gjennom hele innsette og grunnventilasjon fra første dag. CO2-nivået skal alltid være under 3000ppm, også i startfasen. Unngå trekk. Opplevelse av lite aktive kyllinger kan være et tegn på for høye CO2-verdier og behov for økt ventilasjon.

Age (Days)	Dry Bulb Temperature at RH% - °C (°F)			
	40 (%RH)	50 (%RH)	60 (%RH)	70 (%RH)
Day-old	36.0 (96.8)	33.2 (91.8)	30.8 (84.4)	29.2 (84.6)
3	33.7 (92.7)	31.2 (88.2)	28.9 (84.0)	27.3 (81.1)
6	32.5 (90.5)	29.9 (85.8)	27.7 (81.9)	26.0 (78.8)
9	31.3 (88.3)	28.6 (83.5)	26.7 (80.1)	25.0 (77.0)

Note: Dry bulb temperatures, at the Ideal RH are colored red.

Temperatur i strøet: 28-30 grader. Lufttemperatur i kylling høyde: 30 grader. Ideell RH: 60-70%. Kilde: Aviagen



Monitor Chicks

Measure vent temperature.

Vent Temp 39.4 - 40.4°C (103 - 105°F)

Crop fill

2 hrs = 75%


6 hrs = 80%

12 hrs = 85%

24 hrs = 95%

48 hrs = 100%

Percentage of birds with full crops.





Cold

- Kylling klumper seg sammen.
- Vil bli stress og bråkete



***Kyllingen sprer seg fint utover foringsareal.**



Hot

Kyllingen beveger seg fra foringsarealet ut mot vegg. Kyllingen sprer vingene og begynner å pese.